

Actuación en casos de sintomatología COVID* en colegiales del CMU Pablo Serrano de Teruel

1. El aislamiento en caso de sospecha será, por defecto en la habitación del colegial, y sólo tras la confirmación del positivo se determinará si es trasladado a una zona de aislamiento.

3. El afectado notificará el positivo o contacto estrecho a la UPRL (jefcuprl@unizar.es) con copia al responsable COVID del centro (peluher@unizar.es) incluyendo la información requerida por el punto 4.2 de la Instrucción de notificación de casos de contagio

1.
Aislamiento en habitación

2.
Comunicación externa (112) e interna (recepción / responsable COVID)**

3.
Notificación de positivo o contacto estrecho

4.
Traslado o cuarentena local

2. El propio colegial, salvo imposibilidad, llamará al 112 para que traslade aviso a los Servicios de Salud, a los cuales describirá sus síntomas para recibir las instrucciones pertinentes. A continuación comunicará la situación de aislamiento preventivo al responsable COVID del centro (peluher@unizar.es) y a recepción (978618131 / 976761112*), informando sobre la previsión de pruebas en el centro, traslado a Centro de Salud, etc.
* Tfno. de emergencias nocturnas para horario de rondas exteriores de los vigilantes

4. El afectado valorará si tiene que pasar la cuarentena en el CMU o si, bajo su responsabilidad y con el beneplácito de los Servicios de Salud, se traslada a su domicilio, para lo cual NO deberá utilizar el transporte público. Si permanece en el CMU, se someterá a las condiciones de higiene que conlleva el aislamiento (menaje desechable, doble bolsa para basura, desinfección, etc.).

*El mismo protocolo se aplicará a los contactos estrechos de los positivos confirmados por PCR.

** El personal recepción o el responsable COVID avisará a los subdirectores para que estos contacten con el afectado y alerten a posibles contactos estrechos, debiendo estos extremar las precauciones hasta conocer resultados PCR del contacto sintomático (el aislamiento es preceptivo cuando se confirma el positivo, pero puede ser aconsejable **antes** si los síntomas son evidentes).